

アトルバスタチン錠5mg・10mg「ZE」

を服用される患者様へ

このお薬は、高コレステロール血症の治療薬です。
血液中のコレステロールを減らし、動脈硬化の進行を抑制します。

アトルバスタチン錠5mg「ZE」



アトルバスタチン錠10mg「ZE」



このお薬を服用するときは、以下の点にご注意ください。

! 主治医または薬剤師に指示された用法・用量を守ってください。

◆ 飲み忘れた場合は、気がついた時に**できるだけ早く1回分**を飲んでください。
絶対に**2回分を一度に**飲んではいけません。

◆ 誤って多く飲んだ場合は、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。

◆ 指示なしに、ご自分の判断で飲むのを止めないでください。

! **グレープフルーツジュース**で飲んだり、服薬前後は控えてください。
飲酒もほどほどにしましょう。

! 別に薬を飲んでいる場合は、主治医または薬剤師に伝えてください。また、別の病気で他の病院にかかるときも、この薬を飲んでいることを必ず医師に伝えてください。**薬の飲み合わせによって副作用がでやすくなります。**

1回分



おくすり
1回2錠



お薬は効果と副作用の両面を持ち合わせています。
副作用がみられても早期に発見し適切な処置を行えば大事に至ることはほとんどありません。
主治医または薬剤師の指示に従い、ただしく飲みましょう。

このお薬でおこることが知られている副作用

おうもんきんゆうかいししょう

横紋筋融解症、免疫介在性壊死性ミオパチー

発生頻度：ごくまれ

- ◆ 筋肉の副作用です。
- ◆ 次のような症状のいくつかが同じ時期にみられれば「横紋筋融解症」の可能性があります。
ただちに服用を止めて、すぐに主治医または薬剤師に連絡してください。

筋肉が痛い



手足のしびれ・けいれん

手足に力が入らない



歩行困難 など

尿の色が濃い
(赤褐色になる)



劇症肝炎等の肝炎、肝機能障害、黄疸

発生頻度：ごくまれ

- ◆ 肝臓の副作用です。
- ◆ 次のような症状があらわれたら「肝炎、肝機能障害、黄疸」の可能性がります。
服用を止めて、なるべく早く主治医または薬剤師にご相談ください。

吐気がする・吐く

全身がだるい

食欲がない

皮膚や白目が黄色くなる

尿が褐色になる など

このほかにもお薬を飲んで体調がおかしいと感じたら主治医または薬剤師に相談ください。

施設名：